

## DEFINIZIONE DI CASO<sup>1</sup>

### Caso sospetto

**A.** Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale),

E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica

E almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina<sup>2</sup>, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

**oppure**

- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente (in una struttura sanitaria di un paese/città) dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

**B.** Una persona con malattia respiratoria acuta

E almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

**oppure**

- *ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;*

**oppure**

- *ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCoV;*

---

<sup>1</sup> **N.B.:** la definizione potrà variare in base all'andamento della malattia e che gli aggiornamenti saranno sempre disponibili sul sito dell'OMS

<sup>2</sup> I medici dovrebbero prestare attenzione anche alla possibilità di presentazioni atipiche in pazienti immunocompromessi.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

"Contatto stretto" è definito:

- Esposizione dovuta ad assistenza sanitaria, compresa assistenza diretta a pazienti affetti da nCoV, lavorare con operatori sanitari infettati da nCoV, visitare pazienti o permanere nello stesso ambiente di un paziente con nCoV.
- Lavorare a stretto contatto o condividere lo stesso ambiente con un paziente con nCoV.
- Viaggiare con un paziente con nCoV, con qualsiasi mezzo di trasporto.
- Vivere nella stessa casa di un paziente con nCoV.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame